

ЭХИОН™, кЭ

Рекомендации по применению

культура	объект	норма расхода препарата, л/га	способ, время обработки, ограничения
рожь озимая и тритикале	мучнистая роса, ржавчина, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез	0,5	опрыскивание в период вегетации
пшеница яровая и озимая	мучнистая роса, ржавчина, септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса	0,5	опрыскивание в период вегетации
ячмень яровой и озимый	мучнистая роса, ржавчина, сетчатая пятнистость	0,5	опрыскивание в период вегетации
райграс пастбищный, кострец, овсяница луговая (семенники)	гельминтоспориоз	0,5	опрыскивание в период вегетации
клевер луговой (второго года жизни)	антракноз, аскохитоз, бурая пятнистость	1,0	опрыскивание в фазу стеблевания 0,2% рабочей жидкостью
смородина черная (маточники)	американская мучнистая роса, антракноз, септориоз	1,5	опрыскивание в период вегетации 0,15% рабочей жидкостью
смородина черная (маточники, питомники)	американская мучнистая роса	0,4-0,5	опрыскивание в период вегетации 0,05% рабочей жидкостью
мята перечная	ржавчина	0,5	опрыскивание в период вегетации
рапс яровой	альтернариоз, мучнистая роса	0,5	опрыскивание в конце цветения культуры
свекла сахарная	церкоспороз	0,75-1,0	опрыскивание в период вегетации